

- 36 Weiden, MD, et al. Preoperative Chemotherapy (Cisplatin and Fluorouracil) and Radiation Therapy in stage III Non-small Cell Lung Cancer. *Chest* /106/6/oecember, 1984/supplement 344s~347s
- 37 Bonomi, et al. Escalating Paclitaxel Doses Combined With Carboplatin / Etoposide and Thoracic Radiotherapy as preoperative or Definitive Treatment for Stage III Non-small cell Lung Cancer. *Seminars in Oncology*. Vol 23, No6, suppl 16(December). 1996: pp 102~107
- 38 Ratto, M. D, et al. A Randomized Trial of Adoptive Immunotherapy with Tumor - Infiltrating Lymphocytes and Interleukin-2 Versus Standard Therapy in the postoperative Treatment of Resected Non-Small Cell Lung Carcinoma. *Cancer*. May 1, 1996/volume 78/Number2 244 ~ 251

## 手掌巨大恶性淋巴瘤1例

杨瑞合 姜达

患者，女，48岁。住院号289326。1986年3月发现右手掌小鱼际中部皮肤干燥，且痒甚微痛，不久形成1cm长的皲裂且渗黄色液体，后渐渐形成蚕豆大小硬结并痒痛。无发热及盗汗。1996年5月在湖北省某县医院行激光切除，3月后于原硬结处迅速生长为2×2cm大小的肿物，呈菜花状，表面溃烂渗黄色液体。至1996年7月就诊时肿物长至6×6cm大小，状如前。病理学诊断：淋巴肉瘤大无裂细胞型（见图3—4）（病理号：96—5381）。经COHP方案化疗2疗程，肿物大部回缩，达PR。其治疗仍在进行。

讨论：恶性淋巴瘤（ML）是一种起源于淋巴造血组织的实体瘤，其临床表现变化多端，特别是结外型淋巴瘤几乎可侵犯人体各种组织和器官，包括皮肤、骨骼、骨髓和中枢神经系统以及睾丸等男女外生殖器等。但原发于手掌部位，病史长达10年之久，且形成巨大菜花状肿物者，临床实属罕见。此例给我们一启示，对不明原因的皮肤干燥、皲裂，久治不愈溃疡者，应尽早行病理学检查，明确诊断，合理治疗。

作者单位：050011 河北医科大学第四医院肿瘤内科

## 第四届全国肿瘤流行病学学术会议征文通知

中国抗癌协会肿瘤流行病学专业委员会定于1999年年中（具体日期另行通知）在天津市召开第四届全国肿瘤流行病学学术会议。届时除交流学术论文外，还将邀请国内外专家作专题讲演，同时召开专业委员会会员代表大会，进行换届改选。现发布征文通知如下：

### 一、征文内容：

1. 肿瘤分布及时间趋势；
2. 肿瘤危险因素和病因学研究；
3. 肿瘤预防和防治策略；
4. 新技术、新方法（包括实验室和统计方法）在研究中应用。

**二、投稿要求：**最新的研究成果或尚未在公开杂志上发表的论文，论文要求4000字以内并附摘要500字以内，摘要应扼要阐明研究目的、方法、结果和结论。文稿用15开400字方格稿纸书写，最好用A4纸计算机打印，注明作者单位、通讯地址和邮编，稿件要加盖单位公章，自留底稿，不退稿。

**三、截稿日期：**1998年12月31日（以邮戳为准）。

**四、邮寄地点：**天津市河西区体院北环湖西路 邮编：300060

天津市肿瘤研究所流行病学研究室 王庆生（收）（信封上注明征文字样）

稿件录用后将向作者发出会议通知。稿件将汇编成论文集并择优在专业刊物或其增刊上发表。

中国抗癌协会肿瘤流行病学专业委员会

1998年3月